



VHD Dental

CENTRO DE ODONTOLOGÍA - VHD.Dental -> mi-dentista-mallorca.com

Dr. Víctor J. Hernández Darías - Odontólogo* Dentista

Col.Nº 07001360 * NIF/NIE 78852805L

Avenida de Picasso 61 bjs drcha, E-07014 Palma de Mallorca

info@my-dentist-mallorca.com * Tel. (+34) 971 57 36 87 * Móvil (+34) 648 66 81 08 * Fax (+34) 971 57 36 88

Datos personales

Fecha:

Nombre y Apellidos:

Fecha de Nacimiento:

Hoja de información para el paciente
Inyección para la corrección de tejidos / aumento de volumen con ácido hialurónico en la zona de la boca

Estimado/a paciente:

Usted se encuentra hoy en nuestro consultorio porque desea realizarse un tratamiento con ácido hialurónico. Sólo realizamos este tratamiento a petición y para mejorar su bienestar.

El ácido hialurónico es una sustancia producida naturalmente en el cuerpo que se utiliza desde hace muchos años en odontología y para las inyecciones de rejuvenecimiento facial. El ácido hialurónico se tolera muy bien y puede retener agua en una cantidad que supera muchas veces su propio volumen. Hidrata la piel y rellena suavemente las arrugas desde el interior. Con el tiempo, el cuerpo lo disuelve por completo. Los seguros médicos no cubren los costes de las inyecciones de ácido hialurónico ni los eventuales tratamientos posteriores.

El ácido hialurónico restaura el volumen perdido y revitaliza la piel. Las líneas y arrugas superficiales se alisan y las arrugas profundas se rellenan.

Además, se pueden corregir las encías o incluso rellena o modelar los labios. En las intervenciones quirúrgicas, se administra directamente en la herida para mejorar su curación.

El Dr. Víctor J. Hernández Darías sólo utiliza productos de máxima pureza, tolerancia y totalmente libres de alérgenos. No es necesario realizar una prueba de alergia antes del tratamiento.

Los productos de ácido hialurónico no poseen un efecto permanente, por lo que deben renovarse cada seis o doce meses.

El tratamiento con el Dr. Víctor J. Hernández Darías ofrece la ventaja de que siempre se utiliza un spray para anestesia superficial y se suministra anestesia intraoral.

Por lo tanto, la aplicación es completamente indolora.

A continuación, el ácido hialurónico se inyecta bajo la piel utilizando las agujas más finas, especialmente fabricadas para el tratamiento estético.

Esta zona se masajea ligeramente después de la inyección para adaptar el material implantado a los contornos del tejido. Un tratamiento dura entre 30 minutos y una hora.

Riesgos y posibles complicaciones:

Inmediatamente después del tratamiento, puede producirse enrojecimiento, hinchazón, un ligero dolor o una leve hemorragia, que suelen desaparecer al cabo de unas horas.

En casos raros, especialmente en pacientes inmunodeprimidos, no se puede descartar la inflamación de la piel y la hipodermis con formación de abscesos, hematomas, necrosis, formación de costras y cicatrices, así como alteraciones sensoriales en las zonas tratadas.



VHD Dental

CENTRO DE ODONTOLOGÍA - VHD.Dental -> mi-dentista-mallorca.com

Dr. Víctor J. Hernández Darias - Odontólogo* Dentista

Col.Nº 07001360 * NIF/NIE 78852805L

Avenida de Picasso 61 bjs drcha, E-07014 Palma de Mallorca

info@my-dentist-mallorca.com * Tel. (+34) 971 57 36 87 * Móvil (+34) 648 66 81 08 * Fax (+34) 971 57 36 88

En raras ocasiones, los pacientes que padecen herpes en la cara pueden tener una reaparición del herpes como resultado del tratamiento.

Como reacción al material extraño, pueden formarse granulomas dentro o debajo de la piel, que suelen desaparecer con el tratamiento farmacológico, pero a veces permanecen de forma permanente. La cicatrización de la superficie y el endurecimiento de la piel (fibrosis) o incluso la atrofia del tejido son muy poco habituales.

En casos muy raros, la inyección accidental del material de relleno en los vasos sanguíneos puede provocar una discapacidad visual temporal o permanente o incluso ceguera. A pesar de todo el cuidado que se tiene, no se puede descartar con seguridad que se produzcan hiper o hipocorrecciones al inyectar el tejido.

La hipocorrección –es decir que no hay efecto visible del tratamiento– debe corregirse repitiendo el tratamiento.

La hipercorrección –demasiado volumen– puede eliminarse mediante una inyección de la enzima hialuronidasa que degrada el ácido hialurónico.

Reglas de comportamiento recomendadas para después de la inyección:

Después del tratamiento, durante los tres o cuatro días siguientes, debe evitar el consumo de alcohol, las visitas al sauna o al hammam (baño turco) y la exposición a los rayos UV del sol o del solárium.

No haga ejercicio ni deportes el día de la inyección.

Además, durante las primeras seis horas después del tratamiento, no se deben tocar las zonas tratadas de la cara ni se debe aplicar allí maquillaje u otros cosméticos.

He leído y comprendido la declaración de consentimiento para el tratamiento con ácido hialurónico.

La naturaleza, el alcance, los riesgos y las posibilidades de éxito del tratamiento me fueron explicados detalladamente en una charla informativa.

Seguiré las indicaciones de comportamiento. Me informaron que eventualmente pueden ser necesarios varios tratamientos para conseguir el resultado deseado. He reflexionado cuidadosamente sobre mi decisión. No necesito más tiempo para pensar en ello. Consiento plenamente el tratamiento.

Palma de Mallorca,

firma